

## Tentamen functionaalanalyse 16 januari 2009

- Zet op elk vel dat je inlevert je naam.
- Schrijf met een (naar voorkeur blauwe) pen, niet met potlood.
- Laat bij elke (deel)opgave duidelijk zien hoe je aan je antwoorden komt.
- Ook als je een onderdeel van een opgave niet kunt maken mag je dat onderdeel uiteraard wel gebruiken.
- Boek(en), cursusmateriaal en aantekeningen mogen gebruikt worden, rekenmachines mogen niet gebruikt worden.
- *SUCCES!*

1. Zij  $H$  een separabele Hilbertruimte met volledig orthonormaalstelsel  $(e_{l+3})_{l \in \mathbb{N}}$  en  $T : H \rightarrow H$  de d.m.v.

$$\begin{aligned}Te_{3k-2} &= \frac{e_{3k}}{\ln k} \\Te_{3k-1} &= \frac{e_{3k-1}}{\ln k} \\Te_{3k} &= \frac{e_{3k-2}}{\ln k}\end{aligned}$$

gedefinieerde continue lineaire operator.

- (i) Geef de matrix  $A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \subseteq M_{3 \times 3}(\mathbb{C})$  aan die  $T$  t.o.v.  $\{e_{3k-2}, e_{3k-1}, e_{3k}\}$  op de door deze vectoren opgespande invariante deelruimte representeert. Is  $A$  over  $\mathbb{R}$  diagonaliseerbaar? Hoe ziet de Jordan normaalvorm van  $A$  over  $\mathbb{C}$  eruit?
- (ii) Laat zien dat  $T$  een compacte zelfgeadjungeerde operator is.
- (iii) Is  $T$  zelfs een Hilbert–Schmidt operator?
- (iv) Bereken de spectrale representatie  $T = \sum_{\lambda \in \sigma(T)} \lambda \pi_{\lambda}$ .
- (v) Hoe ziet de polaire decompositie van  $T$  eruit?

2. Men noemt een lineaire operator  $T : \ell^2 \rightarrow \ell^2$  een spoor-klasse operator als  $T = S \circ R$  kan worden geschreven als de compositie van twee Hilbert–Schmidt operatoren  $S, R \in K^2(\ell^2)$  en schrijft  $K^1(\ell^2)$  voor de verzameling van alle spoor-klasse operatoren op  $\ell^2$ .

(i) Ga na dat  $K^1(\ell^2)$  uit compacte operatoren op  $\ell^2$  bestaat. Kun je nu (of later) bewijzen dat  $K^1(\ell^2) < K^2(\ell^2)$  een deelvectorruimte is? Neem in ieder geval aan dat dit klopt en verifieer dat  $K^1(\ell^2)$  een tweezijdig ideaal is van de  $C^*$ -algebra van alle begrensde operatoren op  $\ell^2$ .

(ii) Laat zien dat de spoor

$$\text{tr}(T) := \sum_{n=1}^{\infty} \langle Te_n | e_n \rangle$$

van een spoor-klasse operator eindig is en onafhankelijk van het gekozen volledig orthonormaalstelsel  $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ . *Hint:* gebruik dat het inproduct

$$\langle R | S \rangle = \sum_{n \in \mathbb{N}} \langle Re_n | Se_n \rangle$$

van twee Hilbert-Schmidt operatoren niet van de keuze van  $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$  afhangt.

(iii) Onder welke extra voorwaarde kun je  $\text{tr}(T) = \sum_{\lambda \in \sigma(T)} \lambda \dim E_\lambda$  bewijzen?

(iv) Verifieer dat  $A = \sqrt{T^*T}$  voor  $T \in K^1(\ell^2)$  eveneens een spoor-klasse operator is.

(v) Toon aan dat

$$\|T\|_1 := \sum_{n=1}^{\infty} \langle A((\delta_{kn})_{k \in \mathbb{N}}) | (\delta_{kn})_{k \in \mathbb{N}} \rangle$$

(waar  $A = \sqrt{T^*T}$  en de rij  $(\delta_{kn})_{k \in \mathbb{N}}$  op de  $n$ -de plek 1 en verder 0 is) een norm op  $K^1(\ell^2)$  definieert.

(bonus) Laat zien dat  $T$  dan en slechts dan in een spoor-klasse operator is als  $\|T\|_1 < \infty$ .

3. Zij  $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$  een volledig orthonormaalstelsel van de Hilbertruimte  $H$ . Definieer  $Te_1 := 0$  en voor  $k \geq 2$

$$Te_k := \frac{1}{kl} \sum_{i=1}^l \frac{1}{n_i} e_{p_i}$$

waarbij  $k = p_1^{n_1} \cdot \dots \cdot p_l^{n_l}$  de ontbinding van  $k$  in priemgetallen is.

(i) Bereken  $Te_k$  voor  $k = 51, 52, 53, 54, 55$ .

Zet  $T$  lineair op het opspansel  $F = \langle e_k | k \in \mathbb{N} \rangle$  voort.

(ii) Laat zien dat  $T : F \rightarrow F$  begrensd is en zet  $T$  voort tot een begrensde lineaire operator  $T : H \rightarrow H$ .

(iii) Hoe werkt de geadjungeerde operator  $T^*$  op de  $e_k$ ?

(iv) Is  $T$  compact?

(v) Construeer een oneindigdimensionale gesloten invariante deelruimte  $E < H$  waarvoor de restrictie  $T|_E : E \rightarrow E$  van eindige rang is.